

JULHO AMARELO

Mês de conscientização sobre as **hepatites virais**

**CUIDADO: VOCÊ PODE
SE CONTAMINAR ONDE
MENOS IMAGINA!**

PREVINA-SE. VACINE-SE. FAÇA O TESTE.

A hepatite é uma doença silenciosa e não é transmitida somente por meio de relações sexuais desprotegidas. Informe-se e proteja-se.



SUS-BH 



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

GOVERNANDO PARA QUEM PRECISA

HEPATITES VIRAIS

As hepatites B e C são Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e também podem ser transmitidas pelo sangue. Geralmente não apresentam sintomas e a pessoa pode levar anos para perceber que está doente. Os sintomas, quando presentes, podem provocar cansaço, tontura ou ânsia de vômito; a pele e os olhos ficam amarelados, a urina escura e as fezes mais claras. O diagnóstico e o tratamento precoces podem evitar a evolução para cirrose ou câncer de fígado.

Pessoas que transaram sem camisinha, compartilharam agulhas ou seringas, receberam transfusão de sangue ou fizeram tatuagem antes de 1993 devem procurar um posto de saúde e realizar os testes rápidos para hepatites B e C.



HEPATITE B

A vacina contra a hepatite B está disponível nos centros de saúde para todas as idades. São necessárias três doses para garantir a completa imunização: o intervalo entre a primeira e a segunda dose é de um mês, e entre a primeira e a terceira dose é de seis meses.

Pessoas detectadas com hepatite B podem fazer o tratamento gratuito pelo SUS. Faça logo o seu teste!

A hepatite B pode ser transmitida para o bebê durante a gestação e na hora do parto!

É importante fazer o teste logo no início da gestação e iniciar o tratamento, caso seja indicado, para que o vírus não seja transmitido ao bebê.

Toda gestante não vacinada e com testagem negativa tem o direito de receber a vacina anti-hepatite B após o primeiro trimestre de gestação. Os recém-nascidos de gestantes portadoras dessa doença devem receber a vacina e a imunoglobulina humana preferencialmente na maternidade, nas primeiras 12 horas de vida.

HEPATITE C

Desde 2002, o SUS disponibiliza o tratamento para essa doença. Em 2015, foram incorporados novos medicamentos para a hepatite C crônica, com menos efeitos adversos. O tratamento, quando indicado, é altamente eficaz, com taxas de cura em torno de 95%.

Toda gestante deve ser testada para hepatite C, preferencialmente no primeiro trimestre do pré-natal. O tratamento não está indicado para gestante mas, após o parto, a mulher deverá ser tratada.

A gravidez deverá ser evitada enquanto durar o tratamento e durante os seis meses seguintes ao seu término.

Não existe vacina para a hepatite C. Siga as orientações de prevenção!

PREVENÇÃO DAS HEPATITES B e C



Use camisinha.

Tenha seu próprio **kit para manicure**, com tesoura, alicate, espátula etc.



Ao fazer tatuagem ou colocar piercing, **exija material descartável.**



Não compartilhe seringas e agulhas.


Não compartilhe escovas de dentes e lâminas de barbear ou de depilar.



SALÕES DE BELEZA, CLÍNICAS DE ESTÉTICA E ESTÚDIOS DE TATUAGEM E PIERCINGS

ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO

- Esterilizar todo o material (alicates, pinças, tesouras, espátulas) após o uso, a cada cliente.
- Higienizar escovas e pentes de cabelo com água e sabão.
- Trocar agulhas a cada procedimento: tatuagem, piercings, acupuntura etc.
- Utilizar ceras individualizadas e nunca reutilizá-las.
- Usar individualmente, ou apenas uma vez, seringas, lâminas, alicates e outros materiais perfurocortantes.
- Pedir aos clientes que tragam seu kit manicure e pedicure.
- Descartar material perfurocortante em coletores adequados.
- Verificar o calendário vacinal para hepatite B de todos os funcionários.



FAÇA O TESTE PARA HIV, SÍFILIS E HEPATITES VIRAIS.

Procure o centro de saúde ou o serviço especializado mais próximo:

CTA Sagrada Família: R. Joaquim Felício, 141 - Sagrada Família | 3277-5757

CTA UAI: R. Saturnino de Brito, 17, 3º andar, Shopping UAI - Centro | 3246-7007

CTR DIP Orestes Diniz: Al. Vereador Álvaro Celso, 241 - Santa Efigênia | 3277-4341

URS Centro-Sul: R. Paraíba, 890 - Funcionários | 3277-5356