



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE

Gerência de Integração dos Cuidados em Saúde - GEICS/DIAS  
Gerência de Rede Ambulatorial Especializada – GERAЕ/DMAC

### SOLICITAÇÃO DE ESTUDO URODINÂMICO PELO GINECOLOGISTA DA APS

Visando o acesso oportuno e resolutivo das mulheres as cirurgias ginecológicas para tratamento da Incontinência urinária, a Secretaria Municipal de Belo Horizonte, após criteriosa avaliação realizada pela Diretoria de Regulação de Média e Alta Complexidade e Coordenação de Atenção Integral à Saúde da Mulher resolve que os ginecologistas dos Centros de Saúde poderão solicitar estudo urodinâmico para pacientes com indicação dos seguintes procedimentos:

- 0409070203 - Burch;
- 0409010499 - Inc. Urinária via Abdominal;
- 0409070270 - Inc. Urinária via Vaginal;
- 0409010430 - Tratamento Cirúrgico de Cistocele (prolapso de parede anterior da vagina grau III e IV do POP-Q);
- 0409070050 - Colpoperineoplastia Anterior e Posterior; (prolapso de parede anterior da vagina grau III e IV do POP-Q);
- 0409060020 - Colpoperineoplastia Anterior e Posterior com amputação de colo; (prolapso de parede anterior da vagina grau III e IV do POP-Q);
- 0409070084 - Colpoperineoplastia Anterior; (prolapso de parede anterior da vagina grau III e IV do POP-Q).

As pacientes que necessitarem realizar o estudo urodinâmico previamente à cirurgia deverão ter seu pedido cadastrado pela unidade de saúde para marcação sob regulação e somente depois de agendado e realizado deverá ser emitida a AIH para o procedimento cirúrgico.

Lembramos ainda que, para a realização do exame é necessário o seguinte preparo:

- Tentar ficar sem urinar por, pelo menos, 3 horas antes do exame;
- Trazer resultado de exame de urina rotina realizado até 60 dias antes do exame;

*Em casos de infecção urinária, a usuária deverá retornar ao médico solicitante para tratamento com antibiótico. Nesse caso, o exame deverá ser remarcado, prioritariamente, logo após o tratamento da infecção urinária.*

- O exame não poderá ser realizado no período menstrual;
- Trazer exames anteriores (estudo urodinâmico) se houver;

Considerando a possibilidade de bacteriúria no pós exame em torno de 12%, recomenda-se o uso profilático de Ciprofloxacino 500 mg pela manhã e outro à noite no dia do exame.

Os centros de saúde que não tiverem ginecologistas deverão articular o atendimento da usuária com a Gerência de Assistência Epidemiologia e Regulação (GAERE).