



USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS

IPRATRÓPIO

0,25 MG/ML | SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO |

USO ADULTO E PEDIÁTRICO |



- O brometo de ipratrópio promove a dilatação dos brônquios, auxiliando no tratamento de doenças respiratórias que causam obstrução das vias aéreas.
- Sua ação facilita a entrada e a saída de ar dos pulmões, contribuindo para a melhora da respiração.

Precauções de uso:



Proteja os olhos do paciente durante a administração, principalmente pessoas com glaucoma. Atente para sintomas que possam indicar complicações oculares:

- Desconforto ou dor ocular, visão turva, formação de imagens coloridas ou com halos na visão, olhos avermelhados ou edema de córnea.



Este medicamento pode ocasionar: cefaleia, tontura, irritação na garganta, tosse, boca seca, náusea e distúrbios da motilidade gastrointestinal.



Em casos raros, pode acontecer o efeito contrário (broncoconstrição) e **piorar a falta de ar**.





Gestantes devem ser avaliadas pelo médico antes de usar este medicamento.

Orientações de uso correto:

1

Para **gotejar o medicamento corretamente**, mantenha o frasco na posição vertical e aplique uma leve pressão em sua parede lateral, conforme mostrado na imagem.



2

Via inalatória: a dose prescrita deve ser diluída em Cloreto de sódio 0,9% até um volume final de 3 - 4 mL. Em caso de doses acima da posologia usual: 2 mg (40 gotas, até 4x/dia) para pacientes maiores de 12 anos e adultos e 1 mg (< 20 gotas, até 4x/dia) para menores de 12 anos. Certifique-se com o médico responsável antes de realizar a administração.

3


A solução diluída deve ser nebulizada e inalada até seu completo consumo. Sempre que houver oxigênio disponível, recomenda-se administrá-la com fluxo de 6 a 8 L/min.

4

Utilize máscara de tamanho adequado e bem ajustada ao rosto do paciente, **cobrindo nariz e boca**, para que não ocorram vazamentos e exposição ocular à névoa do medicamento.

5

A máscara e o copinho do nebulizador devem ser mantidos na **posição vertical** durante todo o procedimento.



6

O paciente deve ser orientado a respirar lentamente pela boca para melhorar a deposição pulmonar do medicamento.

7

O tempo médio de inalação pode variar entre 5 a 20 minutos, conforme o volume da solução, o tipo de nebulizador, o fluxo utilizado e a habilidade do paciente em realizar a técnica inalatória.

8

Após o procedimento, mantenha o frasco em temperatura ambiente (entre 15 °C e 30 °C), protegido da luz solar e da umidade.

9

Higiene do nebulizador: após cada uso, lave o copinho e a máscara com água e sabão neutro. Enxágue bem, deixe secar naturalmente e não guarde as peças úmidas.

ATENÇÃO!

Anote no frasco a data de abertura do medicamento. Após a abertura, ele poderá ser utilizado por até **25% do período restante até a data de validade indicada na embalagem**.