

ONDE REALIZAR OS TESTES RÁPIDOS?

- Todos os **Centros de Saúde**
- **Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA):**

CTA Hipercentro

Shopping Caetés: R. Caetés, 466, Piso Caetés
Centro - (31) 3277-7007

CTA/SAE Sagrada Família

R. Joaquim Felício, 141
Sagrada Família - (31) 3277-5757



ATENÇÃO!

**TODA PARCERIA DEVE REALIZAR
OS TESTES RÁPIDOS PARA HIV,
SÍFILIS E HEPATITES B E C**



**Veja tudo sobre Teste
Rápido e prevenção às IST
em pbh.gov.br/ist**



**BELO
HORIZONTE**
PREFEITURA DO POVO

AQUI O TRABALHO NÃO PARA



**BELO
HORIZONTE**
PREFEITURA DO POVO

AQUI O TRABALHO NÃO PARA



RÁPIDO E PRÁTICO
Resultado em até 30 min



CONFIÁVEL E SEGURO
99% de acerto

TESTE RÁPIDO

Práticos e de fácil execução, são realizados com a coleta de uma gota de sangue na ponta do dedo, ou com saliva no caso do autoteste para HIV. Veja neste material tudo que você precisa saber sobre o assunto!





JANELA IMUNOLÓGICA

É o tempo entre a infecção por um vírus ou bactéria (como HIV, hepatites ou sífilis) e o momento em que o exame consegue detectar essa infecção no corpo. Quando o organismo ainda não produziu anticorpos suficientes, o teste pode dar resultado negativo mesmo se a pessoa estiver infectada. Se a suspeita continuar, repita o teste após 30 dias (para HIV e sífilis), e pelo menos 60 dias para hepatites B e C.

TESTES RÁPIDOS DISPONÍVEIS




HIV

O teste rápido para HIV deve ser realizado com regularidade e sempre que houver situações de risco (acidentes com material biológico, violência sexual ou relação sexual sem uso de preservativo, por exemplo).



HEPATITES B E C

Pessoas acima de 45 anos devem realizar os testes para hepatites B e C. Todas as pessoas que ainda não se vacinaram para Hepatite B devem procurar o centro de saúde e fazer a sua imunização. O tratamento da hepatite C cura mais de 95% das pessoas.



SÍFILIS

A sífilis tem cura! O tratamento está disponível em todos os Centros de Saúde para você e sua parceria.

Se você já teve sífilis, será realizado o exame de sangue para confirmação.



HTLV

O vírus é transmitido por relações sexuais, compartilhamento de agulhas e seringas, transfusão de sangue e durante a gestação e amamentação. A prevenção ocorre pelo uso de preservativos e realização dos testes rápidos.



AUTOTESTE

HIV

O autoteste também tem resultado em até 30 minutos, mas pode ser feito a qualquer momento, em um local conveniente, na companhia de uma pessoa de confiança (caso seja necessário). O resultado reagente (positivo) indica que a pessoa pode estar infectada pelo HIV. Entretanto, esse resultado não é definitivo. Nesse caso, é necessário procurar o serviço de saúde para realizar outros testes que confirmarão ou não o resultado reagente.



GESTANTES:

PROTEÇÃO PARA VOCÊ SEU BEBÊ!

Algumas infecções podem ser transmitidas para o bebê durante a gravidez, o parto ou a amamentação. Por isso é muito importante realizar os testes rápidos durante o pré-natal e no momento do parto.

Quando fazer o teste no pré-natal?

- No início do pré-natal
- No 3º trimestre de gestação
- No momento do parto, quando indicado pelo profissional de saúde



VOCÊ SABIA?

ADOLESCENTES PODEM FAZER OS TESTES SEM ACOMPANHANTE, COM A GARANTIA DE:

- sigilo
- acolhimento
- privacidade
- orientação em saúde

