



DESCARTE DE MEDICAMENTOS

Não descarte medicamentos vencidos ou que não serão mais utilizados no lixo comum ou no reciclável, na pia, no vaso sanitário ou no ralo.

O descarte incorreto pode contaminar o solo e a água e causar danos ao meio ambiente.

Procure seu Centro de Saúde para mais informações sobre onde e como fazer o descarte de forma segura.

As embalagens vazias e as bulas podem ser descartadas no lixo comum, desde que estejam limpas e sem resíduos do medicamento.



pbh.gov.br/saude



 DOENÇAS RESPIRATÓRIAS #3

USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS

AMOXICILINA

AMOXICILINA 50 MG + ÁCIDO CLAVULÂNICO 12,5 MG/ML

AMOXICILINA 50 MG/ML | PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO



O QUE É E PARA QUE SERVE?

A amoxicilina é um medicamento antibiótico usado para tratar infecções causadas por bactérias. Ela pode ser indicada para infecções na garganta, no ouvido, no nariz, nos pulmões, na pele, no trato urinário e em outras partes do corpo. A amoxicilina elimina as bactérias que causam a infecção e ajuda na recuperação. Ela pode ser usada sozinha ou juntamente com clavulanato, que pode ser indicado em algumas infecções mais graves.

Atenção: a amoxicilina **só combate bactérias**.


Não é eficaz para gripe, resfriado ou dor de garganta comum. Esses problemas geralmente são causados por **vírus**, e a amoxicilina **não os elimina**.

Tomar este medicamento sem necessidade **não vai melhorar sua saúde e pode fazer mal**.

COMO PREPARAR?

O medicamento que você recebeu está na forma de pó e precisa ser preparado com água filtrada antes do uso. Após o preparo, ele se transforma em um líquido, pronto para ser tomado. Esse líquido é chamado de suspensão oral. Para prepará-lo, siga as instruções abaixo:

1. Com o frasco ainda fechado, agite-o bem para soltar todo o pó.
2. Abra a tampa e adicione água filtrada aos poucos, até a marca indicada no rótulo.
3. Coloque a tampa novamente e agite o frasco até que o pó esteja completamente misturado com a água, sem grumos.
4. Depois de agitar, verifique se o líquido chegou à marca indicada no rótulo. Se estiver abaixo da marca, espere a espuma baixar e adicione um pouco de água filtrada. Agite novamente e verifique o nível. Se ainda estiver abaixo da marca, repita esse procedimento até que o líquido atinja a marca indicada.



COMO GUARDAR DEPOIS DE PREPARADO?

- Amoxicilina comum: guarde em um lugar fresco, arejado e longe do sol ou na geladeira (nunca no congelador). Pode ser usada por até 14 dias após o preparo.
- Amoxicilina com clavulanato: geralmente é necessário guardar na geladeira (verifique na embalagem do seu frasco). Após o preparo, pode ser utilizada por 7 a 10 dias, conforme orientação do fabricante. Não pode ser congelada.

Em caso de dúvida, pergunte ao farmacêutico.

COMO USAR?

- Siga exatamente a dose e o horário indicados na receita.
- Use o copo medidor ou a seringa que acompanha o medicamento. Não use colher de cozinha, pois ela pode levar a erros na dose e prejudicar o tratamento.
- Agite bem o frasco antes de cada uso.

FIQUE ATENTO!

- Este medicamento deve ser utilizado somente com receita e orientação de um profissional de saúde.
- Informe ao profissional de saúde se estiver grávida ou com suspeita de gravidez.
- Não utilize medicamento vencido, sobras de tratamentos anteriores ou medicamento fornecido por outras pessoas (familiares, amigos ou vizinhos).
- Após finalizar o uso do medicamento, caso um ou mais sintomas da infecção não melhorem ou voltem a aparecer, procure sua equipe de saúde.
- Pode ocorrer diarreia leve, enjoo ou vômito. Se esses sintomas incomodarem muito ou não passarem, procure o Centro de Saúde.
- Pare de tomar e procure rapidamente um serviço de saúde se:
 - ocorrer coceira intensa, manchas vermelhas na pele ou dificuldade para respirar;
 - tiver diarreia muito forte, com sangue ou com muita dor na barriga.
- Não pare o tratamento antes da hora: mesmo que você já esteja se sentindo bem, termine todos os dias de tratamento indicados na receita.

Por quê? Se você parar antes, as bactérias mais fortes podem sobreviver, se multiplicar e fazer a infecção voltar ainda mais difícil de curar. Isso também pode fazer com que o medicamento perca o efeito no futuro, caso precise usá-lo novamente. Esse problema é chamado de resistência.
- Prazo para começar o tratamento: depois que a receita é feita pelo profissional de saúde, ela vale por apenas 10 dias. Por isso, comece o tratamento o mais rápido possível dentro desse prazo.